【正誤表】

『**形成外科治療手技全書 I 形成外科の基本手技 1**』
下記 2 点誤りがございました。
ここに謹んで訂正致します。

p.79 表 1

【誤】 エステル型、アミド型を分ける罫線の位置が間違っていました。

	エステル型		アミド型				
薬剤名	プロカイン塩酸塩	テトラカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩	ブピバカイン塩酸塩	ロピバカイン塩酸塩	レボブピバカイン塩酸塩
代表的な商品名	塩酸プロカイン® ロカイン®	テトカイン®	リドカイン® キシロカイン® キシロカイン® エピネフリン含有	カルボカイン®	マーカイン®	アナペイン®	ポプスカイン®
持続時間	～1 時間	1～2 時間	1～2 時間	1～2 時間	2～3 時間	～10 時間	～10 時間
基準最高容量（浸潤麻酔）	1,000mg	100mg	200mg	500mg	—	—	—
基準最高容量（伝達麻酔）	400mg	100mg	200mg	500mg	100mg	300mg	150mg
その他		異常エステラーゼや血清エラスターゼの減少している患者では注意して投与			心毒性が高いとされる		

【正】

	エステル型		アミド型				
薬剤名	プロカイン塩酸塩	テトラカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩	ブピバカイン塩酸塩	ロピバカイン塩酸塩	レボブピバカイン塩酸塩
代表的な商品名	塩酸プロカイン® ロカイン®	テトカイン®	リドカイン® キシロカイン® キシロカイン® エピネフリン含有	カルボカイン®	マーカイン®	アナペイン®	ポプスカイン®
持続時間	～1 時間	1～2 時間	1～2 時間	1～2 時間	2～3 時間	～10 時間	～10 時間
基準最高容量（浸潤麻酔）	1,000mg	100mg	200mg	500mg	—	—	—
基準最高容量（伝達麻酔）	400mg	100mg	200mg	500mg	100mg	300mg	150mg
その他		異常エステラーゼや血清エラスターゼの減少している患者では注意して投与			心毒性が高いとされる		

克誠堂出版（株）

p.162 図 1

【誤】（b）の縫合法の名称が間違っていました。



~~（b）水平マットレス縫合~~

【正】



（b）水平片側埋没マットレス縫合
（Horizontal mattress suture with
an intradermal comportnent）

克誠堂出版（株）