

【正誤表】

『形成外科治療手技全書 I 形成外科の基本手技 1』

本書 p.79 表 1 に下記誤りがございました。
ここに謹んで訂正させていただきます。

【誤】 エステル型、アミド型を分ける罫線の位置が間違っていました。

	エステル型				アミド型		
薬剤名	プロカイン 塩酸塩	テトラカイン 塩酸塩	リドカイン 塩酸塩	メピバカイン 塩酸塩	プピバカイン 塩酸塩	ロピバカイン 塩酸塩	レボプピバカイン 塩酸塩
代表的な 商品名	塩酸プロカイン® ロカイン®	テトカイン®	リドカイン® キシロカイン® キシロカイン® エピネフリン含有	カルボカイン®	マーカイン®	アナペイン®	ポプスカイン®
持続時間	～1時間	1～2時間	1～2時間	1～2時間	2～3時間	～10時間	～10時間
基準最高容量 (浸潤麻酔)	1,000mg	100mg	200mg	500mg	—	—	—
基準最高容量 (伝達麻酔)	400mg	100mg	200mg	500mg	100mg	300mg	150mg
その他		異常エステラーゼや血清エラスターゼの減少している患者では注意して投与			心毒性が高いとされる		

【正】

	エステル型			アミド型			
薬剤名	プロカイン 塩酸塩	テトラカイン 塩酸塩	リドカイン 塩酸塩	メピバカイン 塩酸塩	プピバカイン 塩酸塩	ロピバカイン 塩酸塩	レボプピバカイン 塩酸塩
代表的な 商品名	塩酸プロカイン® ロカイン®	テトカイン®	リドカイン® キシロカイン® キシロカイン® エピネフリン含有	カルボカイン®	マーカイン®	アナペイン®	ポプスカイン®
持続時間	～1時間	1～2時間	1～2時間	1～2時間	2～3時間	～10時間	～10時間
基準最高容量 (浸潤麻酔)	1,000mg	100mg	200mg	500mg	—	—	—
基準最高容量 (伝達麻酔)	400mg	100mg	200mg	500mg	100mg	300mg	150mg
その他		異常エステラーゼや血清エラスターゼの減少している患者では注意して投与			心毒性が高いとされる		